

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



23 juin 1986 RÉGION RHÔNE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03  
N° de série continue 126

Bulletin n° 16

LE BULLETIN VOUS DONNES DES INFORMATIONS : COMPLETEZ LES PAR VOS OBSERVATIONS

ARBORICULTEURS RESPECTEZ LES DELAIS D'EMPLOI DES PRODUITS AVANT RECOLTE

- P1 : CERISIER : Monilia et Mouche** : une protection encore nécessaire en région tardive  
PECHER : **Tordeuse Orientale, Maladies de conservation** : le point sur la protection des fruits  
**Pucerons d'été** : surveillez vos vergers
- P2 : PRUNIER : Carpocapse, Rouille** : renouvelez la protection  
POIRIER-POMMIER : **Tavelures** : fin des contaminations primaires  
**Carpocapse** : Evolution de la 1ère génération
- P3 : POMMIER : Mineuse Marbrée** : pas de traitement. **Cerclée** : bientôt la 2ème génération  
**Puceron vert** : surveillez vos vergers  
FRAMBOISIER : **Botrytis** : protégez votre récolte  
CASSIS-MELON : Attention à l'**Oïdium**
- P4 : VIGNE : Mildiou, Oïdium** : en floraison toujours des risques  
**Botrytis** : Aménagement de la lutte en 1986

## ARBRES FRUITIERS

### CERISIER

**MONILIA ET MOUCHE** : Poursuivez la protection en région tardive  
Un vol toujours soutenu à VESSEAUX, MONTPEZAT et ALBA.

**ANTHRACNOSE** : Des taches dans des vergers mal protégés

**PUCERON NOIR** : **Traitement inutile**. Ce puceron va bientôt migrer.

### PECHER

**TORDEUSE ORIENTALE** : **Protégez vos fruits**

Actuellement les captures sont faibles (sauf LAURAC), mais le début du 2ème vol ne devrait pas tarder.

Pour la protection des pêches, plusieurs cas sont à envisager :

• **Variétés précoces** : (récolte avant le 5 juillet, type Springcrest) : **pas de traitement**

• **Variétés semi-précoces** : (Dixired) **1 traitement** 15 jours avant récolte (R - 15)

Une variété dont le début de cueille est prévue le 15 juillet sera traitée le 1er juillet

• **Variété de saison** : (Redhaven, Red top...) **2 traitements** (R - 27 j et R - 15 j)

Une variété dont le début de cueille est prévue le 25 juillet sera traitée le 28 juin et le 10 juillet

• **Variétés tardives** : (Fantasia, M. Franciscan...) **3 traitements** (R - 39 j ; R - 27 j et R - 15 j)

Une variété dont le début de cueille est prévu le 11 août sera traitée les 4 - 16 et 28 juillet

**Produits homologués ou en autorisation provisoire de vente (g ma/hl)**

(nombre de jours : délai d'emploi avant récolte)

\*Azinphos éthyl et méthyl : 40 (nb spéc) (15 jours)

\*Carbaryl : 120 (SEVIN L 85) (7 jours)

Deltaméthrine : 1,75 (DECIS, DECIS FLOW)

Dichlorvos : 125 (nb spéc) (5 jours)

\*Fénitrothion : 50 (nb spéc) (15 jours)

\*Fenvalerate : 7,5 (SUMICIDIN 10) (21 jours)

Fenpropathrine : 10 (DANITOL) (15 jours)

\*Méthidathion : 40 (ULTRACIDE 20 BOUILLIE) (15 jours)

Méthomyl : 75 (LANNATE 20 L) (7 jours)

Mévinphos : 50 (PHOSDRIN W 10, PHOSLIT 10, MEVINTOX) (7 jours)

\*Parathion éthyl et méthyl : 25 (nb spéc) (15 jours)

Phosalone : 60 (AZOPHENE, ZOLONE) (15 jours)